

～インフルエンザ生ワクチンをご希望の方へ～

インフルエンザ生ワクチン〈フルミスト〉は昨シーズンに認可されたワクチンです。注射の痛みがなく、1回で完了し、その効果は1年ほど持続します。また、生ワクチンのため理論上効果的です。ただ、当院では初めての導入になります。そのため、他院とは異なる条件を設けた部分もありますのでご了承ください。

- ☐①小学生以上 18歳以下であること：本来は2歳以上18歳以下ですが、鼻に接種するため、頭部を抑えることに同意してくれるお子さん。
- ☐②鼻をかめること：鼻水が垂れていた場合は、かんでから接種します。
- ☐③著しい鼻閉がないこと
- ☐④免疫抑制剤*の内服や注射治療を受けていないこと：外用は可能です。
*デュピクセント、イブグリース、アドトラザー等の注射
ネオオーラル、オルミエント、リンヴォック、サイバインコ、プレドニン、セレスタミン、リンデロン等の内服。他にも心配なお薬があれば、お電話でご相談ください。
- ☐⑤喘息がないこと、また肺の基礎疾患が無いこと：はっきりと喘息と診断をされていなくても、吸入することが度々ある方はできない可能性があります。
- ☐⑥本剤、ゼラチン、卵および鶏肉由来のものにアレルギーがないこと：卵は過去にあったとしても現在食べられていれば可能です。本剤へのアレルギーが一度でもあった方は不可。
- ☐⑦妊娠の可能性のない方（接種前1か月間避妊）、授乳中でない方：加えて接種後2か月間は避妊の必要があります。
- ☐⑧サリチル酸系医薬品（アスピリン、ボルタレン、ポンタール等）を服用していないこと
- ☐⑨同居家族に免疫の弱い人、妊婦、授乳婦、乳児がいないこと：ウィルスは最長で4週間排出されていることがあり、1-2週間は周囲に感染する可能性があります。
- ☐⑩不活化ワクチンとの併用はできません。
- ☐⑪副反応として、鼻汁鼻閉が約半数にあり、発熱が6%ほどあること
- ☐⑫本剤によるインフルエンザ発症があること：2%ほどあり、この際抗インフルエンザ薬を使用するとワクチンの効果が減弱する可能性があります。
- ☐⑬接種から1-2週間程度は迅速検査で陽性反応がでるため、その期間に発熱した場合は臨床所見からインフルエンザと診断する場合があります。

①－⑨に該当し、⑩－⑬にご理解頂ける場合はご予約ください。

2025/9/20